

予防接種手帳(別冊)をよく読み、接種医師と相談のうえ、予防接種を理解し、正しく受けましょう。

## 子どもの標準的な予防接種スケジュール

ワクチン	出生時	生後6週後	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
インフルエンザ菌 b型 (ヒブ)			①	②	③						④					☆2か月～5歳未満											
小児用肺炎球菌			①	②	③						④					☆2か月～5歳未満											
B型肝炎				①	②	③										☆出生時～1歳未満											
ロタウイルス1価			①	②							初回接種は、 生後14週6日 までに接種する				☆生後6～24週未満												
ロタウイルス5価			①②③								初回接種は、 生後14週6日 までに接種する				☆生後6～32週未満												
四種混合・二種混合				①	②	③					④	四種混合			☆2か月～ 7歳6か月未満		二種混合	☆11歳～13歳未満 (小学6年生で通知)									
BCG						①										☆出生時～1歳未満											
MR (1期)(2期)											1期	☆1歳～2歳未満		2期	☆5歳～7歳未満で 小学校就学の前年度 (年長児に通知)												
水痘											①	②				☆1歳～3歳未満											
日本脳炎													①	②	③				④				☆①～③6か月 ～7歳6か月未満 ☆④9歳～13歳未満 (小学4年生で通知)				
子宮頸がん																☆小学6年生～高校1年生の女性 (中学1年生で通知)						①	②	③			

\*濃い色は、標準的な接種期間となります。

\*☆印は、公費で接種できる期間です。

\*おたふくかぜワクチンは任意接種となります。公費助成はありません。

①～④は接種回数

### 全額公費負担 定期予防接種(A類疾病)

2023年4月現在

種類	対象年齢	回数	標準的な間隔等
ロタウイルスワクチン ※接種する種類により 接種回数が異なります。	1価	生後6週0日から24週0日後までの間にある者 (生後24週0日までに4週間以上の間隔をおいて2回)	2回
	5価	生後6週0日から32週0日後までの間にある者 (生後32週0日までに4週間以上の間隔をおいて3回)	3回
インフルエンザ菌 b型(Hib) ※接種開始時期により 接種回数が異なります。	初回：接種時年齢が生後2か月から7か月未満の場合 (生後12か月に至るまでに初回接種3回完了) 追加：初回接種3回終了後7か月から13か月の間	3回	27日～56日
	初回：接種時年齢が生後7か月から12か月未満の場合 (生後12か月に至るまでに初回接種2回完了) 追加：初回接種2回終了後7か月から13か月の間	2回	27日～56日
	初回：接種時年齢が生後1歳から5歳未満の場合	1回	
小児用肺炎球菌 ※接種開始時期により 接種回数が異なります。	初回：接種時年齢が生後2か月から7か月未満の場合 (生後24か月に至るまでに初回接種3回完了、ただし、2回目は1歳を超えない) 追加：1歳を過ぎて、初回接種3回終了後60日以上間隔をあけて	3回	27日以上
	初回：接種時年齢が生後7か月から12か月未満の場合 (生後24か月に至るまでに初回接種2回完了) 追加：1歳を過ぎて、初回接種2回終了後60日以上間隔をあけて	2回	27日以上
	初回：接種時年齢が生後1歳から2歳未満の場合 追加：初回接種終了後、60日以上間隔をあけて	1回	
	初回：接種時年齢が生後2歳から5歳未満の場合	1回	
B型肝炎	生後1歳未満	3回	27日以上あけて2回 1回目から139日以上あけて1回
四種混合 (DPT-IPV)	1期初回：生後2か月から7歳6か月未満	3回	20日～56日
	1期追加：7歳6か月未満	1回	1期初回終了後1年～1年6か月
BCG	生後1歳未満	1回	
麻しん、風しん(MR)	1期：1歳～2歳未満	1回	
	2期：5歳から7歳未満で小学校就学の前年度(年長児)	1回	
水痘(水ぼうそう)	初回：12か月から36か月に至るまで	1回	
	追加：36か月に至るまで	1回	初回接種終了後3か月以上
日本脳炎	1期初回：生後6か月から7歳6か月未満	2回	6日～28日
	1期追加：7歳6か月未満	1回	1期初回終了後 おおむね1年後
	2期：9歳から13歳未満	1回	
二種混合(DT)	2期：11歳から13歳未満	1回	
子宮頸がん (HPV)	中学1年生から高校1年生相当の女子 初回接種から サーバリックスは1か月後、6か月後の各1回 ガーダシル、シルガードは2か月後、6か月後の各1回	3回	